



Doppelbilder

Was sind Doppelbilder und wie wirken sich diese aus?

Doppelbilder können in unterschiedlicher Form und Ausprägung auftreten: vertikal, horizontal oder verkippt. Doppelbilder können in eine bestimmte Blickrichtung auftreten, nur in der Ferne oder auch nur in der Nähe. Sie können immer oder auch nur zeitweise vorhanden sein.

Doppelbilder sind für Betroffene extrem störend. Sie führen zu Schwindel, Unsicherheit, Einschränkung im Alltags- und Arbeitsleben und Orientierungsstörungen. Mit Doppelbildern ist das Autofahren nicht gestattet. Werden Doppelbilder nicht behandelt, so kann dies einen negativen Einfluss auf andere Therapien haben.

Ursache

Doppelbilder entstehen oft durch Bewegungsstörungen der Augen. Diese können durch verschiedene Grunderkrankungen ausgelöst werden wie Schlaganfall, Zuckerkrankheit, Verletzungen, Bluthochdruck, Schilddrüsenerkrankung, Muskelentzündung, Infektionen, Tumore, ... Deshalb ist bei akut auftretenden Doppelbildern eine umfassende und rasche Untersuchung/Abklärung unbedingt erforderlich.

Harmlose Ursachen für Doppelbilder sind dekompenzierte Schielneigungen oder altersbedingte Muskelermüdungen. Zur Differenzierung ist eine genaue orthoptische Diagnostik notwendig.



Messung der
Augenmuskelfunktionen
bei Doppelbildern

Therapie bei Doppelbildern

Ich arbeite schon jahrelang mit Patienten/Patientinnen die an Doppelbildern leiden und konnte fast allen helfen. Traurigerweise wissen immer noch viel zu wenige Menschen, dass es bei Doppelbildern gute und rasche Hilfe gibt. Dazu sind genaue Messungen erforderlich und es werden meist spezielle Folien (Prismenfolien) oder Prismenbrillen angepasst. Fallweise kann auch eine orthoptische Visualtherapie zur Verbesserung eingesetzt werden.

